

# 塩化ベンザルコニウム(逆性石けん)の使用方法

主な消毒箇所

屋外


床下

床上

☆塩化ベンザルコニウム[オスバン等]の原液（10%濃度）を、水道水で100倍に希釈して、使用してください。

## 100倍希釈液の調整方法

塩化ベンザルコニウムの原液  
ペットボトルの蓋1杯分  
(約5mL)



500mLのペットボトル1本分の  
水道水(500mL)

両方をバケツに入れてよく混ぜる

## 消毒液の使い方

**事前準備** 泥などの汚れを拭き取るなどをして取り除いておく。

ジョウロや噴霧器、霧吹きなどで消毒液を吹きかけてから拭きあげるか、そのまま換気して乾燥させる。

または、希釈した液に雑巾を浸して拭く。

## 注意事項

- 上記の調整方法は、原液の濃度が10%の場合です。
- 希釈した消毒液は効果が失われていきます。速やかに使い切ってください。
- 他の消毒液剤と混ぜて使用してはいけません。
- 消毒箇所に汚れが残っていると、**消毒の効果は著しく弱まります。**
- 原液は、手荒れの原因になることがあります。
- 目に入った場合は、水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください。
- **ペットボトルに入れて保存すると、誤って飲んでしまう場合があります。**  
**【消毒液注意】と書き記すなど、取り扱いには十分注意してください。**